

# Instrucciones para la mezcla de Similac® NeoSure®

Nombre del paciente: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

En ocasiones, los bebés prematuros requieren estrategias de alimentación personalizadas. Siga las instrucciones a continuación para su bebé en etapa de desarrollo.

Concentración calórica*	Agua (onza líq.)	Cucharadas† de NeoSure® en polvo (cucharadas rasas no compactadas)	Rendimiento aproximado (onza líq.)
<input type="checkbox"/> 20 cal/onza líq.	4.5	2	5
<input type="checkbox"/> 22 cal/onza líq. (estándar)	2	1	2
<input type="checkbox"/> 24 cal/onza líq.	5.5	3	6
<input type="checkbox"/> 27 cal/onza líq.	8	5	9

Recomendación de alimentación del profesional de atención de la salud:

---



---



---



---

Firma del profesional de atención de la salud: \_\_\_\_\_



¡Las madres pueden inscribirse y obtener ahorros y asistencia para Similac® NeoSure® StrongMoms® de forma **GRATUITA!**

Obtenga hasta **\$300** en premios de membresía\*

Los estudios sobre alimentación de niños prematuros con Similac NeoSure han demostrado los siguientes resultados clínicos:

- excelente crecimiento compensatorio<sup>1</sup>
- mejora en la composición corporal<sup>2,†</sup>
- mejora en el desarrollo del lenguaje<sup>3,‡,§</sup>
- mejora en el desarrollo visual<sup>3,‡,||</sup>

\* El médico del bebé debe supervisar el uso de fórmulas hipocalóricas e hipercalóricas.

† Utilice la cuchara provista en la lata de Similac NeoSure.

‡ En comparación con niños a los que se alimentó con una fórmula sin DHA ni AA en un ensayo clínico con fórmulas infantiles de Similac® Special Care® y Similac NeoSure con hierro, antes del agregado de luteína.

§ Basado en un subconjunto de lactantes en un análisis retrospectivo.

|| Agudeza visual medida a una edad corregida de 4 y 6 meses, y evaluada según el PEV (potencial evocado visual).

Referencias: 1. Carver JD, et al. *Pediatrics*. 2001;107(4):683-689. 2. Groh-Wargo S, et al. *Pediatr Res*. 2005; 57:712-718. 3. O'Connor DL, et al. *Pediatr Res*. 2001;108:359-371.



# Forma de preparación de la fórmula infantil de Similac® NeoSure® en polvo

## PREPARACIÓN

### DEBE AGREGAR AGUA



**1** Lávese las manos; limpie las superficies y los utensilios.




**2** Pregunte al médico del bebé si es necesario hervir (esterilizar) los utensilios, los biberones, las tetinas, los anillos y el agua para mezclar antes del uso.



**3** Si el agua hirvió, déjela enfriar a temperatura ambiente.

## GUÍA DE MEZCLA (DILUCIÓN ESTÁNDAR)



**4** Vierta 4 onzas líquidas de agua en un biberón limpio. Agregue 2 cucharadas rasas no compactadas de NeoSure usando únicamente la cuchara que está dentro de la lata, y vuelva a colocar la cuchara seca en la lata.

**5** Vierta 6 onzas líquidas de agua en un biberón limpio. Agregue 3 cucharadas rasas no compactadas de NeoSure usando únicamente la cuchara que está dentro de la lata, y vuelva a colocar la cuchara seca en la lata.

## ALMACENAMIENTO DE LA FÓRMULA



**5a** Una vez hecha la mezcla, almacene la fórmula en el refrigerador de inmediato y úsela en un plazo de 24 horas.

## ALMACENAMIENTO DEL POLVO RESTANTE



**5b** Tape la lata abierta y almacénela a temperatura ambiente. Evite las temperaturas extremas.

### Importante:

Asegúrese de usar la cuchara provista en la LATA.

Use el contenido de la lata abierta en el transcurso de 1 mes.

## ALIMENTACIÓN DEL BEBÉ



**6** Tape el biberón, bata bien y coloque la tetina.



**7** Compruebe la temperatura de la fórmula.



**8** Alimente al bebé.



**9** Una vez que comience a alimentar al bebé, utilice la fórmula en el transcurso de 1 hora o deséchela.

**ADVERTENCIA:** si bien las fórmulas en polvo para niños no son estériles, se pueden utilizar para alimentar a niños prematuros o a niños que padezcan deficiencias inmunológicas únicamente cuando lo indique el médico del bebé. Nunca use un horno microondas para calentar la fórmula. Puede provocar quemaduras graves.