

Instrucciones para la Mezcla de Similac® NeoSure®

¿De qué Manera Puede Ayudar Similac NeoSure?

Los estudios sobre lactantes prematuros alimentados con Similac NeoSure durante el primer año de vida demostraron los siguientes resultados clínicos:

- Excelente recuperación del crecimiento¹
- Mejora del desarrollo visual^{2,†}
- Mejora del desarrollo del lenguaje^{2,†}
- Mejora de la composición corporal^{3,†}



Quédese con Similac NeoSure durante el primer año de su bebé prematuro

* Agudeza visual medida a los 4 y a los 6 meses de edad corregida y evaluada mediante Potenciales Provocados Visuales (VEP, por sus siglas en inglés).

† Frente a los lactantes que se alimentaron con una fórmula sin ácido docosahexaenoico (DHA, por sus siglas en inglés) ni ácido araquidónico (ARA, por sus siglas en inglés) en un estudio clínico con las fórmulas para lactantes Similac® Special Care® y Similac NeoSure que contienen hierro, antes de agregar luteína.

‡ Con base en un subconjunto de lactantes en un análisis post-hoc.



¡Inscríbese para obtener Recompensas de ahorros y apoyo relacionadas con Similac® NeoSure®!



OBTenga HASTA \$400 EN GRANDES OFERTAS

WIC y SNAP ELEGIBLE EN LOS 50 ESTADOS*

* Las ofertas pueden variar.

† Los nombres del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Lactantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) son marcas de servicios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) no respalda ningún bien, servicio ni empresa. Requiere una ficha de documentación médica estatal del WIC. La aprobación estatal del WIC está sujeta a cambios, consulte con su agencia del WIC sobre la disponibilidad.

Referencias: 1. Carver JD, et al. *Pediatrics*. 2001;107(4):683-689. 2. O'Connor DL, et al. *Pediatrics*. 2001;108(2):359-371. 3. Groh-Wargo S, et al. *Pediatr Res*. 2005;57(5, pt 1):712-718.



CÓMO PREPARAR LA FÓRMULA SIMILAC® NEOSURE® EN POLVO PARA LACTANTES

PREPARACIÓN



1 Lave sus manos, las superficies y los utensilios.



2 Consulte al médico de su bebé si es necesario hervir (esterilizar) los utensilios, los biberones, las tetinas, los anillos y el agua para preparar la mezcla antes de utilizarlos.



3 Si hirvió agua, deje que se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente.

GUÍA PARA PREPARAR LA MEZCLA (DISOLUCIÓN ESTÁNDAR)

4a Biberón con 4 fl oz (aprox.) de agua



Vierta 4 fl oz de agua en un biberón limpio. Agregue 2 cucharadas rasas sin compactar de NeoSure, utilizando solo la cuchara incluida con el producto, y devuelva la cuchara seca al envase del producto.

Biberón con 6 fl oz (aprox.) de agua



Vierta 6 fl oz de agua en un biberón limpio. Agregue 3 cucharadas rasas sin compactar de NeoSure, utilizando solo la cuchara incluida con el producto, y devuelva la cuchara seca al envase del producto.



Tape el biberón y agite bien.

ALMACENAMIENTO DE LA FÓRMULA



Una vez mezclado, almacene la fórmula en el refrigerador de inmediato y utilícela en un plazo de no más de 24 horas.

ALMACENAMIENTO DEL POLVO RESTANTE



Tape el envase del producto abierto y almacénelo a temperatura ambiente. Evite exponerlo a temperaturas extremas. Utilice el polvo en un plazo de no más de 1 mes.

ALIMENTACIÓN DEL BEBÉ



6 Agite bien y coloque la tetina.



7 Caliente el biberón si lo desea. Revise la temperatura de la fórmula.



8 Alimente al bebé.



9 Una vez que comience a alimentar al bebé, utilice la fórmula en un plazo de no más de 1 hora, si no, deséchela.

ADVERTENCIA: Las fórmulas en polvo para lactantes no son estériles y se puede alimentar con ellas a lactantes prematuros o que podrían tener problemas inmunitarios solo según las indicaciones del médico de su bebé. Nunca utilice un microondas para calentar la fórmula. Se pueden producir quemaduras graves.